

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Veyxyl 800 mg méhtabletta lovak, sertések és juhok számára A.U.V.

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

Az eseti engedély jogosultja: Dr. Megyesi Pharma Kft. (1125 Budapest, Nagytétényi u. 222.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Veyx -Pharma GmbH (Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, Németország)

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI VEYXYL 800 MG MÉHTABLETTA LOVAK, SERTÉSEK ÉS JUHOK SZÁMÁRA A.U.V.

Veyxyl tabletták 800 mg méhtabletta lovak, sertések és juhok számára A.U.V.  
amoxicillin

### 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 tabletták tartalmaz:

#### Hatóanyag:

Amoxicillin 800 mg

(amely megfelel 918,48 mg amoxicillin-trihidrátnak)

Egyéb összetevő, aminek az ismerete szükséges a helyes alkalmazáshoz: -

### 4. JAVALLATOK

Gram- pozitív és Gram -negatív amoxicillinre érzékeny baktériumok okozta méhgyulladás, valamint magzatburok visszatartás esetén előforduló bakteriális fertőzés kezelésére.

### 5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható penicillinnel és cefalosporinnal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

Nem alkalmazható anuriával és oliguriával társult súlyos veseelégtelenség esetén.

Nem alkalmazható  $\beta$ -laktamáz-termelő kórokozókkal szemben.

Nem adható szájon át kérődzőknek, lovaknak, nyulaknak, tengeri malacoknak, hörcsögöknek és kistrágcshalóknak.

40 kg alatti állatok esetében nem alkalmazható.

### 6. MELLÉKHATÁSOK

Allergiás reakciók (bőrgyulladás, anafilaxia) előfordulása esetén a kezelést azonnal meg kell szakítani. Anafilaxia jelentkezésekor intravénásan epinefrin és glükokortikoid, illetve allergiás bőrreakció esetén antihisztamin és/vagy glükokortikoid adandó.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, sertés, juh

### 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Intrauterin alkalmazásra.

#### KEZELÉSENKÉNT

Ló: 800 mg amoxicillin, ami megfelel 1 db Veyxyl tablettának

Sertés, juh: 400 mg amoxicillin, ami megfelel 1/2 Veyxyl tablettának

A kezelés 2 nap múlva megismétlendő.

### 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A terméket az antibiotikum-érzékenységi vizsgálat eredménye alapján, és az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó hivatalos és helyi irányelvek figyelembevételével kell alkalmazni.



**10. ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Ló, sertés, juh

Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap

Juh tej: 2 nap

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25°C alatt, száraz helyen tárolandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

**12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK**Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések :

A penicillinre vagy cefalosporinra túlérzékeny személyek kerüljék a készítmény bőrrel vagy nyálkahártyával való közvetlen érintkezését.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Bakteriosztatikus készítményekkel együtt nem adható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Túladagolás esetén excitáció és görcsök jelentkezhetnek. Ilyen esetben a készítmény alkalmazását azonnal abba kell hagyni és meg kell kezdeni a tüneti kezelést barbiturátok, benzodiazepinek adagolásával.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

**14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2019. december 23.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK****Rendelhetőség**

Kizárólag állatgyógyászati vényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

**Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**Kiszerezési egységek**

10 db tableta műanyag tolokás dobozban.

100 db-os utántöltő doboz.

