

# ANTILAX IMMUNO

A Veyxal Antilax Immuno-t fiatal állatok emésztési rendellenességeinek (hasmenés) helyreállítására használják borjúban, csikóban, bárányban, kecskegidában és malacban.

## Felhasználási útmutató:

- Folyadék- és elektrolit-veszteségek pótlása, amelyek a betegség folyamán alakultak ki
- Na bicarbonáttal a felborult sav-bázis egyensúly helyreállítása
- Könnyen hozzáférhető energiaforrás biztosítása
- Helyi immunvédelem kialakítása a hasmenést okozó kórokozókkal szemben.

A termék egy különleges eljárással előállított zsírmentes, liofilizált kolosztrum-egyveleget tartalmaz. Ezt a port úgy állították elő, hogy IBR-mentes tehének első főcstejét gyűjtötték össze, amelyeket előzőleg antitesteket tartalmazó savóval immunizáltak, így azokban kialakult az anyai immunitás számos hasmenést előidéző kórokozóval szemben, mint pl. az E. coli és számos vírus (Rotavirus, Corona vírus). A sok tehénből származó standardizált főcstej-egyveleg igen széles skáláját nyújtja az immunoglobulinoknak.

Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.

Ha a hasmenésben szenvedő fiatal állatokkal Veyxal Antilax Immuno-t etettünk, azok bélnyálkahártyáján helyi immunitás alakul ki az antitestek nagy száma következtében.

A baktériumok és vírusok így elveszítik patogenitásukat. A főcstej-keverék még egyéb olyan bioaktív anyagokat is tartalmaz, amelyek szintén a hasmenés kórokozói ellen hatnak, mint amilyen a lakto-peroxidáz és a lizozym. Az nyilvánvaló, hogy a főcstejben lévő védő anyagok hatékonyak más állatfajokban is nem csak a borjakban, annak ellenére, hogy tehének kolosztrumából állították elő.

## Adagolása:

A teljes napi takarmányadag 1 kg-jára jutó kiegészítés.

100 g Veyxal Antilax Immuno-t 1 l langyos vízben oldjunk fel.

Ebből az állat korától, testsúlyától és folyadékvesztésének mértékétől függő mennyiséget adjunk.

## Borjú:

Érdemes naponta 2-3 liter fent leírt módon elkészített Veyxal Antilax Immuno oldatot adni az állatnak, ezen felül tejet szükség szerint. Célszerű az oldatot és a tejet, vagy tejpótló szert napi három alkalomra elosztva az állatnak juttatni.

## Csikó, malac, bárány, gida:

Az anyatej kiszopásának, vagy adásának szokásos rendjét fenn kell tartani. Az itatásra elkészített Veyxal Antilax Immuno oldatot étvágy szerint kell napi 3 alkalommal adni a szopáson kívüli időközökben.

## Összetétel :

Szőlőcukor, banánliszt, zabliszt, nátrium-hidrogénkarbonát, édes-savópor, lenmagliszt, szójaglicin, guármagliszt, nátrium-klorid, szárított élesztő, tejpor /kolosztrumból, IBR mnetes/, magnézium-klorid, szentjánoskenyér-magliszt, kálium-klorid, nátrium-prpoionát, kalcium-klorid.

## Analitikai összetevők:

Nyersfehérje: 11%, nyerszsírok és olajok: 3%,

nyershamu: 11,5%, nyersrost: 1%, metionin: 1%, lizin: 0,9%, klorid: 2,50%,

kálium: 0,70%, nátrium: 3,20%, nedvességtartalom: 8,00%

## Adalékanyagok : /1kg:

### Tápértékkel rendelkező:

L-Lizin HCL: 10.000 mg, DL-metionin: 10.000 mg

### Technológiai adalékanyagok:

Káliumszorbát /E330/, Citromsav

### Érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok:

Aromaanyagok

## Tárolás:

Száraz 25 fok alatti helyen , gyermekektől gondosan elzárva tartandó.