

Antilax Bacto Ferm LauriBiotic

Belsőleges por
Állatgyógyászati gyógyhatású termék



TERMÉKISMERTETŐ

EGYBEN CÍMKE 100 g tasakra és 5 kg műanyag dobozra

A TERMÉK NEVE

VeyFo Antilax Bacto Ferm LauriBiotic belsőleges por
Állatgyógyászati gyógyhatású termék

TERMÉK FORMA

Belsőleges por

ÖSSZETÉTEL

Dextróz-monohidrát, nátrium-klorid, banánliszt, étkezési zab, , nátrium-hidrogén-karbonát, glicin (szójából), guargumi, szentjánoskenyér mag, magnézium-klorid, mono-, di-, és trigliceridek mono-laurinsavból, kálium-klorid, kálium-citrát.

L-lizin HCL 8.100 mg/kg, DL-metionin 7.800 mg/kg, vas (vas (II)-szulfát formájában) 600 mg/kg, E-vitamin 145 mg/kg, nátrium-diacetát 10.000 mg/kg, bentonit 5.000 mg/kg, citromsav 3.000 mg/kg, kálium-szorbát 1.300 mg/kg.

Enterococcus faecium $1,04 \times 10^9$ CFU.

CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés

JAVALLATOK

Ajánlott a fiziológiás emésztés támogatására, a víz- és elektrolit egyensúly stabilizálására. Hasmenés és egyéb emésztőszervi betegségek kiegészítő kezelésére.

* Veyx SV E7300-03 Z5184 „LauriBiotic“ formula Mono-laurilsav, Enterococcus faecium és bentonit támogatja a bélben a védelmi mechanizmust. Kizárólag kiegészítő kezelésként alkalmazandó.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás módja: szájon át, ivóvízben oldva.

100 g VeyFo® Antilax Bacto-Ferm LauriBiotic-ot oldjunk fel 1 liter langyos vízben.
Borjú:

2 - 3 l a felhasználásra kész VeyFo® Antilax Bacto Ferm LauriBiotic feloldott készítményből/nap 3 etetésre elosztva. Ráadásként jóllakásig tejet kell adni.

Csikó, bárány, gida, malac:

Az anyatejes táplálást folytatva, a szopások közötti időben, minimum 3-szor naponta a felhasználásra kész VeyFo® Antilax Bacto Ferm LauriBiotic feloldott készítményt jóllakásig adjuk.

Emésztés támogatására 4 hétig.

Elektrolit háztartási zavarok esetén 1-7 napig.

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK

Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység esetén



FIGYELMEZTETÉSEK

A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes kórképekben szükséges állatorvosi gyógyszeres kezelést. A napi adagot ne lépje túl.

LEJÁRATI IDŐ

A kereskedelmi csomagolású termék lejárat ideje 2 év.
Felbontás után 6 hónapig használható fel.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

20 °C alatt, száraz helyen tartandó.

CSOMAGOLÁS

100 g tasak, 5 kg műanyag doboz

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt terméke, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

Gyártó: Veyx-Pharma GmbH, D 34639 Schwarzenborn Németország

Forgalmazó: Dr. Megyesi Agropharma Kft., 2071 Páty, Somogyi Béla út 53.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

2570/1/NM/2024 NÉBIH ÁTI (100 g)

2570/2/NM/2024 NÉBIH ÁTI (5 kg)

Gyártási szám/ Lejárat ideje: lásd a flakonon