

Antilax Bacto Ferm

Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, gidák és csikók részére.

Felhasználási útmutató:

Az élettani (fiziológias) emésztés stabilizálása akár 4 hétig. Víz és elektrolit egyensúly stabilizálása, mely az élettani emésztést támogatja 1-7 napig. Emésztési zavarok (hasmenés) veszélye esetén, azok tartalma alatt vagy azokból való lábadozáskor.

Összetétel :

Dextróz-monohidrát, nátrium-klorid, banánliszt, étkezési zab, inulin, nátrium-hidrogén-karbonát, glicin (szójából), guargumi, szentjánoskenyér mag, magnézium-klorid, mono-, di-, és trigliceridek mono-laurinsavból, kálium-klorid, kálium-citrát.

Adalékanyagok/1 kg tartalmaz :

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:

10.000 mg cink-oxid, 4.000 mg l-lizin HCL, 4.600 mg DL metionin, 60 mg vas (vas (II) szulfát formájában 3b103, 145 mg E vitamin (3A700).

Technológiai segédanyagok: 10.000 mg nátrium-diacetát, 5.000 mg bentonit 3.000 mg citromsav, 1.300 mg kálium-szorbát.

Zooteknikai adalék: 1,04% x 10⁹ CFU *Enterococcus faecium* (4b1707)

Analitikai összetevők:

Nedvességtartalom: 8,00%, nyersfehérje: 9,00%, nyersolajok és zsírok: 1,20%, nyersrost:1,00%, nyershamu: 20,00%, Nátrium: 5,20%, Klorid: 7,50%, Lizin: 0,45%, Metionin: 0,40%, Kálium: 0,80%,

Adagolása:

100 g VeyFo Antilax Bacto Ferm LauriBiotic-ot 1 liter langyos vízben feloldani.

Borjú:

2-3 l felhasználásra kész VeyFo Antilax Bacto Ferm LauriBiotic feloldott készítményből/nap 3 etetésre elosztva. Ráadásként jóllakásig tejet kell adni.

Csikó, bárány, gida, malac:

Az anyatejes táplálást folytatva, a szopások közötti időben, minimum 3-szor naponta a felhasználásra kész VeyFo Antilax Bacto Ferm LauriBiotic feloldott készítményt jóllakásig adjuk.

Alkalmazás előtt és a felhasználási időtartam növelésekor állatorvos véleményének kikérése javasolt.

Tárolás

Használat előtt felrázandó!

Száraz, 20C alatti helyen, fénytől védve.

Gyermekek elől gondosan elzárandó!