


AZONNALI ÉLETMENTŐ KEZELÉS HASMENÉSES MEGBETEGEDÉSEKNÉL

(nem csak) kölyök és növendék állatoknak

- Vírusok, baktériumok, paraziták vagy stresszhelyzetek (leválasztás, átállás, istálló váltás stb.) okozta gyomor- bélrendszeri megbetegedések szinte mindig súlyos hasmenéses tünetekkel járnak. Ezek sok esetben - még mielőtt az okát diagnosztizálnánk-, az állat elhullásához vagy jobb esetben hosszán tartó és költséges kezelésekhez vezetnek, legyengülés, kiszáradás, felülfertőzések miatt. Az ilyen eseteknél szükséges azonnali tüneti kezelésre állítottunk össze egy teljes termékcsomagot, az állategészségügy szakma és a tudomány jelen állása szerint:



- fájdalmas bélgyörcsök enyhítése, a gyomorperisztaltika lelassítása (Spasmalgen inj.)
- azonnali rehidráció, folyadékpótlás szájon át (MePha Hydral)
- a gyomor és bél nyálkahártyájának nyugtatása és megóvása (Antilax)
- egy esetleg már sérült, erodált bélnyálkahártyán is felszívódó vitamin- és ásványi anyag pótlás (mikroemulziók)
- probiotikummal a bélflóra helyreállítása, baktériumtoxinok megkötése cinkoxid és bentonit segítségével (Imbac ColoCur)



Új! Imbac ColoCur® 10 g, 100 g adagolás injektorban

Minden benne van egy sikeres tüneti kezeléshez!

Gyógyhatású termék, aktív bélflóra stabilizátorral, toxinkötő cinkoxiddal, bentonittal, mikroemulgeált vitaminokkal, probiotikummal, nyomelemekkel, gyógynövénykivonatokkal és természetes növényi olajokkal.

Erősíti a bélflórát, gátolja a kórokozók megtapadását a bél nyálkahártyáján, stabilizálja a fiziológiai emésztést; stimulálja a bél helyi immunrendszerét. Különböző eredetű emésztőrendszeri betegségek kiegészítő kezelésére..

- Emésztési zavarok esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor
- Az étrendi átállás során fellépő táplálkozási egyenlőtlenségek támogatására
- Az elválasztás támogatására



Adagolás:

Mennyiség/nap

Kistestű kutya	1 g
Közepes testű kutya	2 g
Nagytestű kutya	4 g
Macska	2 g
Malac	2 g
Borjú, csikó	4 g
Bárány, gida	2 g

1 g
2 g
4 g
2 g
2 g
4 g
2 g



Összetétel:

96 mg cink-oxid (megfelel 50 mg cinknek), 40 mg réz(II)oxid (megfelel 29 mg réznek), 65 mg E-vitamin, 1,5 mg B1-vitamin, 1,90 mg B2-vitamin, 0,75 mg B6-vitamin, 18 µg B12-vitamin, 25 mg niacinamid, 15 mg kalcium-D-pantotenát, 5 mg vas-fumarát, 3,5 x 10¹⁰ KBE Enterococcus faecium (Cernelle 68), 0,11 mg nátrium-szelenit (megfelel 0,050 mg szelénnek), 15 mg bentonit, lenmagolaj, kamilla és édeskomény, butilsav, propionsav, heptánsav, kaprilsav, kaprinsav és monolaurinsav mono-, di- és trigliceridjei, szójaolaj, napraforgóolaj.

Spasmalgen compositum® inj. 100 ml

Erős simaizom-görcsoldó, láz és fájdalomcsillapító hatással

Hatóanyagok:

metamizol/ hioszcin-butylbromid (butilszkopolamin)

Erős görcsoldó, a sima izmok, elsősorban a gyomor-bél traktus és a húgyutak spazmizálása. Lovak kólikájának kezelésénél azonnali életmentő terápia.

Szarvasmarha/borjú, sertés, kutya: heveny hasmenés támogató kezelése.



Kelet-Magyarország:
Cserevnyák Ivett
+36 70 459 9904
cserevnyak.veyx@gmail.com



Nyugat-Magyarország:
Dervár Cynthia
+36 70 380 4810
dervar.veyx@gmail.com

Dr. MEGYESI AGROPHARMA KFT.
1225 Budapest, Nagytétényi út 222.
www.veyx.hu



ORÁLIS REHIDRATÁCIÓS TERÁPIA


Azonnali életmentő terápia hasmenéses kisállatoknak a kiszáradás ellen: **folyadékpótlás a szájon át**

Ozmózis: Ha két oldatot egy vízáteresztő hátyával elválasztunk egymástól, akkor a **kevesebb oldott molekulát tartalmazó oldatból a töményebb oldatba kezd áramlani a víz**, míg a két oldat közötti koncentrációkülönbség kiegyenlítődik. Ez a folyamat érvényes a bélcsatorna és a véráramlat között, ahol a bél nyálkahártyája a "vízáteresztő hátya" szerepét tölti be.

1.) Magas glükóztartalmú orális rehidráció oldat:

ozmolaritása a véréhez képest magasabb


Hatása: az oldat folyadékpótlásra használhatatlan, mert az ozmózis folytán a vér még több vizet és ionokat veszít. Fokozódik a kiszáradás veszélye, főleg fiatal állatoknál végzetes kimenetelű.



2.) Standard orális rehidráció oldat:

ozmolaritása (oldott molekuláinak koncentrációja) megegyezik a vér normális ozmolaritásával (330 mOsmol/l)

Hatása: a szőlőcukor (glükóz) és a nátrium-ionok kotranszportja elindítja a víz és vele a létfontosságú ionok vér felé irányuló mozgását. A rehidráció oldat pótolja a vérből hiányzó vizet, továbbá a nátrium- és egyéb ionokat, de nem rövidíti meg a hasmenés időtartamát.




3.) A MePha Hydral-ban a szőlőcukor nagyobbik része egy speciális oligoszachariddal lett helyettesítve:

ozmolaritása a véréhez képest kisebb

Működése: Az oligoszacharidból a bélbolysejtek a membránhoz kötött enzimeik által lekapcsolnak egy-egy glükóz molekulát, amely a bélbolysejten keresztül a véráramba szállítható.

Hatása: az oldat folyadékpótlásra kiválóan alkalmas, mert a víz és az ionok a vér felé áramlanak. Így kevesebb vesz el belőlük a székletben, a folyadék és ionpótlás (rehidráció) és ezzel a hasmenéses betegség tüneti kezelése sikeres, a hasmenés időtartama megrövidül.



MePha Hydral® pulvis 1kg

Összetevők: 1 kg tartalma:

Na-karbonát:	84 g	Glükózmonohidrát:	98 g
Na-klorid:	72 g	Oligoszacharid:	608 g
K-klorid:	37 g	Glicin:	90 g
		Aroma: ad	1 kg

1 kg por 25 liter életmentő rehidráció oldat előállítására elegendő!

A Me-Pha-HYDRAL porból előállított orális rehidráció oldat, amely energiában gazdag, mégis hipotóniás (290 mmol/l).

Ez magas oligoszacharid-tartalmának köszönhető. Az oligoszacharidokat a membránhoz kötött enzimek lebontják, így azok glükózként szívódnak fel. Ebből kifolyólag kisebb az ozmotikus aktivitásuk, mint ugyanilyen mennyiségű glükóznak. Ez a mechanizmus csökkenti az ozmotikus hasmenés veszélyét, és a legtöbb esetben 24-48 órán belül a bélsár konzisztenciájának normalizálásához vezet.

A hasmenés gyors elmúlása lehetővé teszi a korai áttérést a tejítatásra, és ezzel csökken az állat kiszáradásának veszélye.

A speciális energiahordozó alacsony ozmolaritása miatt lehetséges más, ozmotikusan aktív hatóanyagok adása, amelyek elősegítik a gyors gyógyulást. A Me-Pha-HYDRAL tartalmú orális rehidráció oldat Na-koncentrációja magas, 90 mmol/l. A koncentráció kiválasztása az emberi kolera elleni harc során szerzett tapasztalatokra épül.

A glicin elősegíti a Na felszívódását, ezzel akadályozza a folyadékvesztést. A magas bikarbonát tartalom hatékonyan korrigálja a metabolikus acidózist, és ezzel csökkenti a kezelt újszülött és növendék állatok közt a visszaesések számát




Felhasználási javaslat: folyadék- elektrolit- és energiapótlás újszülött és növendék állatok fertőző és nem fertőző eredetű hasmenése esetén. A Me-Pha-HYDRAL oldat kiszáradt, de még magától folyadék-felvételre képes állatok rehidráálására szolgál. Egyéb indikációk: stressz, takarmányozási hibák, hosszabb p.o. antibiotikum kúra okozta ozmotikus hasmenés.



Adagolás/használat: 2 csapott mérőkanál port 2 liter 40° C-os vízben oldjunk fel és adjuk az állatnak két napon keresztül, legalább naponta kétszer, a tej helyett. Főként a nagyobb vagy erősen kiszáradt újszülött és növendék állatoknál hatásos, ha az étkezések között több kisebb adagot adunk az oldatból. Az adagolás mindig egy csapott mérőkanál por 1 liter vízhez (40 g Me-Pha-HYDRAL/1 liter víz). A hasmenés elmúltával a 3. naptól a Me-Pha-HYDRAL tartalmú oldat 1/3-a vagy fele helyett adhatunk tejet.

MIKROEMULZIÓK

A mikroemulgeált készítmények kiemelt helyet foglalnak el a Veyx-termékek palettáján. A hatóanyagok itt egy fejlett gyártási eljárás folyamán mikrokapszulákba (1,5 µm alatti részecske nagyság!) zárva jutnak be a szervezetbe. Ez a kapszula nem csak a nyál és a gyomorsav általi lebontástól védi meg a belezárt vitaminokat, hatóanyagokat, hanem egy, a nyirokrendszeren keresztüli speciális felszívódást is lehetővé tesz. A 1,5 mikron alatti kapszulázott mikroemulziós cseppecskék az anyatejhez hasonlóan a bélbolysejtek közötti intercelluláris résen keresztül a nyirokba kerülnek. Ez a felszívódás teljes, és az injekciókkal, illetve hagyományos perorális készítményekkel ellentétben kikerülnek a máj metabolizáló és szűrő szerepét. A nyirokerekeken át a ductus thoracicuson keresztül közvetlen az artériás keringésbe kerülnek, és így teljes mennyiségben a célszervekbe, sejtekbe jutnak.



- a vérben a beadást követően magas hatóanyagértékek mutathatók ki
- a kapszula a gyomorsavnak teljesen ellenáll, csak a vékonybélben bomlik el
- az emulzióképzéshez alkalmazott növényi eredetű vegyület teljesen lebomlik, és emészthető
- az A-vitamin nem akkumulálódik a májban, így nem terheli azt,
- beadása szilárd takarmánnyal vagy ivóvízzel egyaránt történhet.

Mivel a mikroemulgeált hatóanyagok a nyirokrendszeren teljesen felszívódnak, így rendkívül kiadós! Napi adagja egyedenként csak néhány csepp!

Multi-Mulgat 500 ml

Összetétel: földimogyoró olaj, dextróz, vitamin előkeverék

További összetevők: 1 ml MULTI-MULGAT tartalmaz:

A-vitamin	15 000 NE	K ₃ vitamin	1 mg	Nikotinsavamid	24 mg
D ₃ vitamin	130 NE	L-Carnitin	10 mg	Kalcium-pantotenát	20 mg
E-vitamin	25 mg	Biotin	50 µg	Kolinklorid	8 mg
B ₆ vitamin	3 µg	Bétakarotin	2 mg	L-triptofán	0,2 µg
B ₁₂ vitamin	15 µg	Szelén	50 µg	L-triptofán	0,2 µg

Stresszhelyzetekben, vemhesség, laktációban, növekedési időszakban, fokozott teljesítmény-elvárás esetén biztosítja a nélkülözhetetlen tápanyagokat

Adagolás: 1000 liter ivóvízbe: **Szarvasmarha:** 5 ml max. 20 ml, **Ló:** 5 ml max. 15 ml, **Malac:** 1 ml max. 2 ml, **Koca:** 1-3 ml max. 10 ml,

Borjú/növendék: 2 ml max. 10 ml, **Csikó:** 2 ml max. 10 ml, **Bárány:** 1 ml max. 2 ml



Entero-Mulgat 100 ml

Nélkülözhetetlen összetevők a különleges táplálkozási célhoz!

Mikroemulzió (szemcseméret 90 % ≤ 1,5 µm) lenmagolajjal, dextrózzal, cellulózzal, ánizsolajjal, édesköményolajjal, borsmentaolajjal, fahéjolajjal és köményolajjal.

A hirtelen bélműködési rendellenesség kólikás tünetekkel gyors állatorvosi beavatkozást igényel.

A VeyFo® Entero-Mulgat az állatorvos megérkezéséig stimulálja a gyomor-béltraktus emésztő mirigyeinek szekrécióját a takarmányozás után, így ellensúlyozva a súlyos bélrendszeri rendellenesség kialakulásának veszélyét. Ebben az esetben 50 ml-t (fél adagoló) kell adni a lónak testtömegétől függetlenül. A takarmányozás ismételhető ha szükséges.

Alkalmazás: A VeyFo® Entero-Mulgat egy különleges táplálkozási célra szánt takarmány kiegészítő a vastagbél krónikus emésztési rendellenességei és a vékonybél funkció krónikus elégtelenségének javítására. A kezdeti, 6 hónapos időszakban naponta 5 - 25 ml-t javasolt adni a lovaknak a ló testtömegétől függetlenül.



Multi-C-Mulgat 10 ml

Összetevők, 1 ml MULTI-C-MULGAT tartalmaz:

A-vitamin	15 NE	B ₆ vitamin	3 µg	Biotin	0,5 µg
E-vitamin	25 µg	B ₁₂ vitamin	0,015 µg	Kalcium-pantotenát	20 µg
C-vitamin	60 µg	L-carnitin	10 µg	Nikotinsavamid	24 µg
B ₁ vitamin	3 µg	Bétakarotin	2 µg	Kolinklorid	8 µg
B ₂ vitamin	4 µg	K ₃ vitamin	1 µg		



Multivitamin tartalmú emulzió, L- carnitinnel és kolinkloriddal, kedvenc állatok vitamin ellátottságának biztosítására.

Veyxal® Antilax Bactoferm LauriBiotic

A bactoferm a bélműködés élettani védőmechanizmusát támogatja és optimalizálja.

Összetétel:

dextróz-monohidrát, nátrium-klorid, banánliszt, étkezési zab, nátrium-hidrogén-karbonát, glicin (szójából), guarumi, szentjánoskenyérmag, magnézium-klorid, mono-, di-, és trigliceridek mono-laurinsavból, kálium-klorid, kálium-citrát.
L-lizin HCL 8.100 mg/kg, DL-metionin 7.800 mg/kg, vas (vas (II)-szulfát formájában) 600 mg/kg, E-vitamin 145 mg/kg, nátrium-diacetát 10.000 mg/kg, bentonit 5.000 mg/kg, citromsav 3.000 mg/kg, kálium-szorbát 1.300 mg/kg.
Enterococcus faecium 1,04 x 10⁹ CFU.



Borjak, csikók, bárányok, gidák és malacok hasmenéssel járó emésztőszervi megbetegedéseire. Elektrolitok, pufferek és gyorsan, könnyen emészthető energiaforrások mellett esszenciális aminosavakat, vitaminokat, vasat és Bactoferm kivonatot tartalmaz.



Veyxal Antilax bactoferm adagolása:

100 g port 1 liter langyos vízben feloldunk. Az így nyert használatra kész oldatból a növendékállat testtömeg-kg-tól függően javasolt adagja:

borjú: napi 3x1 liter, tejfel ill. tejpótlóval jóllakásig kiegészítve.
csikó, gida, bárány, malac, kutya és macskakölykök:
a szoptatások után naponta 3 alkalommal a bekevert oldatból jóllakásig az állattal megitatni.

A Bactoferm előállítás Lactobacillus starterkultúrák nyerstejbe oltásával, irányított fermentációs folyamattal majd az ezt követő mikroemulgalással és stabilizálással történik.

Az emulzió forma miatt a Lactobacillusok épségben átjutnak a gyomron a vékonybél nyálkahártyájához, itt egyenesen szétoszlanak és aktiválódnak. A Lactobacillusok segítik a táplálkozásélettanilag fontos adhéziós és reszorpciós folyamatokat, kiiktatják a toxinképzőket és kötik a toxinokat. Stabilizálják az élettani bélfloórát ezzel kiszorítják a patogén kórokozókat.

Vey Tosal® inj. 100 ml/250 ml

Roboráns, anyagcserestimuláns

Hatóanyagok:

Butafoszfán 100,00 mg, Cianokobalamin (B12-vitamin) 0,05 mg

Metabolikus vagy reprodukciós rendellenességek kiegészítő kezelésekként, amikor foszfor és cianokobalamin kiegészítés szükséges.

Az ellés körüli időszakban előforduló anyagcserezavarokban, tetánia és ellési bénulás (tejláz) esetén, a magnézium illetve kalcium terápia kiegészítéseként kell alkalmazni.

Izomműködés támogatására foszfor és/vagy cianokobalamin-hiány esetén.



Calciveyxol 38 inf. 500 ml

1 ml Calciveyxol tartalmaz:

Kalcium-glükonát	380 mg
Magnézium klorid hexahidrát	60 mg
Bórsav	50 mg

- Heveny hypocalcaemiás állapotok kezelésére,
- Kiegészítő terápiaként, allergiák, csalánkiütés
- Gyenge méhösszehúzódások esetén
- Fokozott igénybevétel, stresszhelyzetek, illetve betegségek alatt és után, hetente 1-2 alkalommal
- Kiváló szöveti tolerancia, bőr alá is adható



Adagolás: Lassú intravénás alkalmazásra.

Szarvasmarha: Heveny hypocalcaemia esetén: 20-30 ml Calciveyxol 38 infúzió 50 testsúlykilogrammonként intravénásan. (kb 500 ml/tehén)

Kiegészítő terápiaként allergiák, csalánkiütés, vérzés dathesis és méhatónia esetén: 15-20 ml Calciveyxol 38 infúzió /50 testsúlykilogramm intravénásan.

Sertés, juh, borjú: 3-4 ml Calciveyxol 38 infúzió /10 testsúlykilogramm intravénásan.

Jecuplex 500 ml, 5000 ml

Májvédő hatás magas aminosav, L-karnitin, foszfor és B-Vitamin tartalommal

Összetétel: Glükóz 10%, Kalcium-glükonát 1,5%, dihidrogén-foszfát, propilén-glikol, Magnézium-szulfát.

További összetevők: 1 ml Jecuplex tartalmaz:

L-karnitin	7 mg	Dexpanthenol	0,36 mg	L-isoleucin	0,04 mg	B ₂ vitamin	0,04 mg
niacin	3 mg	L-valin	0,1 mg	L-treonin	0,04 mg	B ₆ vitamin	0,18 mg
L-lizin	0,4 mg	L-leucin	0,08 mg	L-hisztidin	0,02 mg	B ₁₂ vitamin	0,85 µg
DL-metionin	0,5 mg	L-fenilalanin	0,06 mg	L-triptofan	0,01 mg		
glicin	0,5 mg	L-arginin	0,04 mg	B ₁ vitamin	0,18 mg		



Ketózis és acetonémia veszélyének csökkentésére, teheneknél az ellés után 3-6 héten belül; anyajuhoknál ellés előtt 6 héttel, utána 3 héten belül.

Adagolás: Tejelő tehén: 500 ml-ig, Anyajuh: 100 ml-ig. Szükség esetén 24 óra múlva megismételhető. Alkalmazása különösen ajánlott az ellés napján, valamint az ellést követő 2.-4. napon! Adagolás kiegészítő májvédelemre: **Szarvasmarha, ló:** 500 ml-ig, **Sertés/Koca:** 200-300 ml, **Malac:** 3-6 ml, **Borjú,** **csikó:** 50 ml-ig, Nedves etetés esetén: malac: 5 - 10 ml/l víz, Ivóvízben adagolva: malac: 0.2 - 2.0 ml/l