

JECUPLEX

Belsőleges oldat
Állatgyógyászati gyógyhatású termék



TERMÉKISMERTETŐ

EGYBEN CÍMKE 500 ml és 5000 ml műanyag flakonra

A TERMÉK NEVE

VeyFo Jecuplex belsőleges oldat
Állatgyógyászati gyógyhatású termék

TERMÉK FORMA

Belsőleges oldat

ÖSSZETÉTEL

Glükóz: 10%, kalcium-glükonát: 1,5%,
nátrium-dihidrogén-ortofoszfát, propilén-glikol,
magnéziumsulfát

1 ml Jecuplex tartalmaz:

L-karnitin	7 mg	Dexpanthenol	0,36 mg	L-isoleucin	0,04 mg	B ₂ vitamin	0,04 mg
niacin	3 mg	L-valin	0,1 mg	L-treonin	0,04 mg	B ₆ vitamin	0,18 mg
L-lizin	0,4 mg	L-leucin	0,08 mg	L-hisztidin	0,02 mg	B ₁₂ vitamin	0,85 µg
DL-metionin	0,5 mg	L-fenilalanin	0,06 mg	L-triptofan	0,01 mg		
glicin	0,5 mg	L-arginin	0,04 mg	B ₁ vitamin	0,18 mg		



CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi, kutya, macska, postagalamb

JAVALLATOK

A termék steril körülmények között gyógyszerkönyvi minőségű alapanyagokból előállított aminosavakat, L-karnitint, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz.

Tejelő tehenek és anyajuhok ketózisának és acidózisának kiegészítő kezelésére.

Különböző okú terhelés és regenerálódás esetén javallott, továbbá májvédő, zsíryanycserét jótékonyan befolyásoló hatású.

Kizárólag kiegészítő kezelésként alkalmazandó.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás módja: szájon át, ivóvízben oldva.

Ketózis megelőzésére:

Tehén: ellés után 3-6 héten belül: 500 ml

Anyajuh: ellés előtt 6 héttel és ellés után 3 héten belül: 100 ml

Szükség esetén 24 óra múlva megismételhető.

Az ellés utáni 2-4 napon:

Tehén: 250-500 ml

Anyajuh: 50-100 ml

Májvédelemre:

Szarvasmarha, ló: 500 ml-ig

Borjú, csikó: 50 ml-ig

Juh, kecske: 100 ml-ig

Sertés / koca: 200-300 ml

Malac: 3-6 ml

Kutya, mérettől függően: 20-50 ml

Nedves etetés esetén: Malac: 5-10 ml/l víz

Ivóvízben adagolva: Malac: 0,2-2,0 ml/l

Tojtyúk: rövid idejű kezelés esetén: 4,0 ml/l-ig, tartós kezelés esetén: 0,5 ml/l-ig

Broiler: rövid idejű kezelés esetén: 2,5 ml/l-ig, tartós kezelés esetén: 0,5 ml/l-ig

Postagalamb: 10 ml/l ivóvíz, /20 galamb/nap, hetente 2-szer

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK

Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység esetén

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes kórképekben szükséges állatorvosi gyógyszeres kezelést. A napi adagot ne lépje túl.

LEJÁRATI IDŐ

A kereskedelmi csomagolású termék lejárat ideje 2 év.
Felbontás után 6 hónapig használható fel.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

20 °C alatt, száraz helyen tartandó.

CSOMAGOLÁS

500 ml és 5000ml műanyag flakonban

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt terméke, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

Gyártó: Veyx-Pharma GmbH, D 34639 Schwarzenborn Németország

Forgalmazó: Dr. Megyesi Agropharma Kft., 2071 Páty, Somogyi Béla út 53.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

2556/1/NM/2024 NÉBIH ÁTI (500 ml)

2556/2/NM/2024 NÉBIH ÁTI (5000 ml)

Gyártási szám/Lejárat ideje: lásd a flakonon